

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ГЕКСИКОН®

Регистрационный номер P N001901/01 от 26.09.2008

Торговое название препарата Гексикон®

Международное непатентованное название хлоргексидин

Лекарственная форма суппозитории вагинальные

Состав

Один суппозиторий содержит:

активное вещество: хлоргексидина биглюконат - 16 мг (хлоргексидина биглюконат используют в виде раствора (концентрация 20%));

вспомогательные вещества: основа для суппозитория – достаточное количество до получения суппозитория массой 3,10 г – макрогол 1500 (полиэтиленоксид 1500) 92 – 98%, макрогол 400 (полиэтиленоксид 400) 8 – 2%.

Описание

Суппозитории белого или белого с желтоватым оттенком цвета, торпедообразной формы. Допускается мраморность поверхности.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептическое средство

Код АТС: G01AX

Фармакологические свойства

Гексикон® – антисептический препарат для местного применения, активен в отношении простейших, грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирусов, в т.ч.: *Treponema pallidum*, *Chlamidia* spp., *Ureaplasma* spp., *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis*, *Gardnerella vaginalis*, *Bacteroides fragilis*, *Herpes-virus*. К препарату слабочувствительны некоторые штаммы *Pseudomonas* spp., *Proteus* spp., а также устойчивы кислотоустойчивые формы бактерий, споры бактерий, грибы. Гексикон® не нарушает функциональную активность лактобацилл. Сохраняет активность (хотя и несколько пониженную) в присутствии крови, гноя.

Фармакокинетика: При интравагинальном применении практически не всасывается, системного действия не оказывает.

Показания к применению

Профилактика инфекций, передаваемых половым путем (хламидиоз, уреаплазмоз, трихомониаз, гонорея, сифилис, генитальный герпес и др.).

Профилактика инфекционно-воспалительных осложнений в акушерстве-гинекологии (перед оперативным лечением гинекологических заболеваний, перед родами и абортom, до и после установки внутриматочной спирали (ВМС), до и после диатермокоагуляции шейки матки, перед внутриматочными исследованиями).

Лечение бактериального вагиноза, кольпитов (в том числе неспецифических, смешанных, трихомонадных).

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и лактации

Возможен прием во время беременности, в период лактации.

Способ применения и дозы

Интравагинально. Перед применением суппозиторий освобождают от контурной упаковки.

Для лечения: по 1 суппозиторию 2 раза в сутки, в течение 7–10 дней.

Для профилактики инфекций, передаваемых половым путем: 1 суппозиторий не позднее 2 часов после незащищенного полового акта.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, зуд, проходящие после отмены препарата.

Взаимодействия

Не рекомендуется одновременное применение с йодом.

Гексикон® не совместим с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза), и мылами, если они вводятся интравагинально. Туалет наружных половых органов не влияет на эффективность и переносимость суппозитория вагинальных Гексикон®, т.к. препарат применяется интравагинально.

Форма выпуска

Гексикон®[®], суппозитории вагинальные, 1 или 5 суппозитория помещают в контурную ячейковую упаковку. Одну контурную ячейковую упаковку с одним суппозиторием и двумя напальчиками, одну или две контурные ячейковые упаковки по 5 суппозитория вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку из картона.

Срок годности

2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

При температуре не выше 25°C.
В недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Изготовитель

ОАО «НИЖФАРМ», Россия

Претензии потребителей направлять по адресу:

603950, г. Нижний Новгород,

ГСП-459, ул. Салганская, 7

тел.: (831) 278 80 88

факс: (831) 430 72 28

Интернет: <http://www.nizhpharm.ru>